



MARCA

AMOXYCOL® WS

DESCRIPCIÓN

Potente Combinación Antibiótica Betalactámica-Polipéptido de Amplio Espectro.

ESPECIES DESTINO



Aves, porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, vacunos.

INDICACIONES

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina y/o colistina: Infecciones del aparato respiratorio, digestivo, urogenital e infecciones de piel y tejidos blandos y prevención de infecciones bacterianas secundarias. Aves: Infecciones respiratorias, salmonelosis, colibacilosis, cólera, enteritis necrótica ulcerativa, estafilo y estreptococosis, coriza, onfalitis e infección del saco vitelino, saculitis, sinusitis, sinovitis, dermatitis gangrenosa. Cerdos: Infecciones respiratorias inespecíficas, rinitis atrófica, enterotoxemia causada por E. coli (enfermedad del edema), colibacilosis entérica, salmonelosis, diarrea neonatal, diarrea de los lechones, diarrea posdestete, diarreas bacterianas, corinebacteriosis, erisipelosis, leptospirosis, dermatitis, entre otras. Prerumiantes: infecciones respiratorias, entéricas, diarreas por Salmonella spp. y E. coli.

FORMULACIÓN

Cada 100 g contiene: Amoxicilina base 20 g, Colistina (como sulfato) 4 g (equivalente a 12 000 000 UI), excipientes c.s.p. 100 g.

DOSIS y ADMINISTRACIÓN

Aves: Preventivo: 1 kg / 2,000 L de agua (o en 1,000 kg de alimento) durante 3-5 días. Tratamiento: 1kg/1,500-2,000 L agua (o en 750-1,000 kg de alimento) durante 3-5 días. Cerdos: Preventivo: 1 kg / 1,500 L agua (o en 750 kg de alimento) durante 3-5 días. Tratamiento: 1kg/1,000-1,500 L agua (o en 500-750 kg de alimento) durante 3-5 días. Individual: 1-2 g/10 kg pv. Terneros, corderos, caprinos y camélidos jóvenes: Terapéutico: 2 veces/día a razón de 1 g/20 Kg por 3-5 días (en agua, leche o alimento). Preventivo: Mitad de dosis.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Sobre de 100 gr, Sobre de 500 gr, Sobre de 1 kg, Sobre de 15 gr.